Invasion acridienne : aggravation de la situation

La situation acridienne dans le pays est marquée actuellement par une infestation élargie par des essaims et des bandes larvaires dans les wilayas du sud et du centre nord . Cette évolution présente de nouveaux indices d'aggravation de la situation acridienne dans les zones agricoles et pastorales.

Au niveau des conditions écologiques, pluies faibles à Tiguent (Trarza), moyennes à Ameira Hasba (Tagant) et Aziatt (Brakna) à fortes dans le secteur de Kankossa (Assaba) ont été enregistrées au cours de la journée d'hier.

La végétation annuelle, bien que verte, est en cours de dessèchement dans les zones d'intervention des équipes aux deux Hodh, en Assaba et au Guidimakha; il n'en demeure pas moins que les conditions d'alimentation et de reproduction sont toujours favorables.

Au niveau acridien l'infestation par des essaims et des bandes larvaires dans les wilayas du sud et du centre nord est un indice de la gravité de la situation acridienne dans le pays.

- Zone sud est (deux Hodh, Assaba et Guidimagha): l'effectif des insectes aux stades larvaires dans cette zone est en très nette diminution. D'une manière générale les larves L5 y sont majoritaires et en mue imaginale. A Dar Houleya/Aioun (Hodh el Gharbi), on note exceptionnellement la présence d'une population larvaire L3 et L4 avec cette dernière en dominance mais en mélange avec des larves L5. Pour ce qui concerne les ailés, ce sont des essaims de jeunes ailés immatures en vol d'entraînement et/ou tourbillonnaire que l'on observe se dirigeant vers l'Ouest et le Nord. Le dessèchement de la végétation annuelle dans ce secteur contribuera à accélérer le phénomène.

- Zone sud ouest (Gorgol, Brakna et Trarza): les insectes sont à tous les stades de développement. Au Gorgol, ce sont des bandes larvaires de L3 à L5 et la mue imaginale avec L5 en dominance.

Au Brakna, on observe des essaims de jeunes ailés se dirigeant vers le nord ouest et des éclosions et des larves de L1 dans le secteur d'Azatt.

Au Trarza, on observe surtout des larves de L2 à L5 avec L3 et L4 en dominance suivant le secteur . Des essaims de jeunes ailés ont été vus aux environs de Garak en déplacement vers le nord ouest.

- Zone centre nord (Tagant): dans cette zone, ce sont des larves de L3 à L5 qui y sont notées avec L4 en dominance. Des essaims de jeunes ailés ont été aperçus en vol tourbillonnaire entre Sangrava et Moudjeria se dirigeant vers le nord ouest.

Suivant différentes sources d'information, des bandes larvaires et des essaims immatures ont été vus en déplacement tout le long de la route nationale à partir du Hodh El Gharbi jusqu'au Tagant

Les opérations de traitements ont couvert 1145 ha portant ainsi le cumul des traitements depuis le 1er juillet 2004 à 115930,5 ha dont 5722 ha effectués par les équipes des Délégations.

En terme de prévisions, selon les services spécialisés du ministère du Développement Rural et de l'Environnement, il est prévu:

- Dans le sud Est du pays la formation des essaims de jeunes ailés se poursuit;
- La continuité du développement larvaire aux niveaux du sud ouest et du centre;
- L'émergence de la deuxième génération au centre et au nord du pays;
- L'arrivée d'essaims allochtones du sud et de l'est;

Au plan des contraintes, on remarque que les moyens d'intervention sont toujours insuffisants par rapport à l'ampleur de l'infestation.